

ЛИНДАВИТ ВИЖН

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Линдавит Вижн.

Международное непатентованное название:

комбинированный препарат.

Лекарственная форма: капсулы для приема внутрь.

Состав: 1 капсула содержит:

активные вещества:

Лютеин (экстракт Бархатцев мелкоцветных 20%)	6,0 мг
Витамин Е (D-альфа токоферол ацетат)	5,0 мг α-TE
β-каротин	1,5 мг
Зеаксантин	1,0 мг
Астаксантин	1,0 мг

вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза, магнезия стеарат, диоксид кремния

капсула: желатин, титана диоксид, железа оксид.

Фармакотерапевтическая группа:

Метаболическое средство для улучшения зрения.

Код АТХ: А11АВ.

Фармакологическое действие:

Фармакодинамика:

Линдавит Вижн – препарат который оказывает защитное и благоприятное действие на глаза и зрение.

Лютеин, Астаксантин и Зеаксантин встречаются в природе в макуле и сетчатке каротиноидов. Они защищают ткани глаз от повреждения солнечным светом. Также они эффективны при лечении возрастных заболеваний глаз, проблем с кровеносными сосудами в глазах и с высоким кровяным давлением. Лютеин, Астаксантин и Зеаксантин защищают клетки линз от окисления, сохраняют их четкость и поддерживают фокусировку на сетчатке. Они поддерживают зрение и помогают снять воспаление.

Витамин Е является жирорастворимым витамином, а также мощным антиоксидантом. Он уменьшает повреждение, вызванное нестабильными молекулами, называемыми свободными радикалами, которые разрушают здоровую ткань глаза.

Бета-каротин принимает участие в синтезе родопсина (visual purple) — основного зрительного пигмента, предназначенного для ночного видения, а также в восстановлении клеток глаза. Замедляет процесс возрастной дегенерации макулы и развитие катаракты, которые приводят к слепоте.

Прием препарата Линдавит Вижн важен для хорошего здоровья глаз.

Фармакокинетика:

Нет данных.

Показания к применению:

Зрительное утомление (усталость и боль в глазах) при чтении, ношении контактных линз, работе с компьютером, при искусственном освещении, при вождении транспортных средств, при сильном солнечном свете.

Способ применения и дозы:

Линдавит Вижн принимают внутрь по 1 капсуле в день, во время еды с

небольшим количеством жидкости. Не превышать рекомендуемую суточную дозу.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.

Беременности период лактации:

При беременности или в период лактации, перед использованием проконсультируйтесь с врачом.

Побочные действия:

Возможно возникновение аллергических реакций.

Передозировка:

Симптомы: тошнота, слабость, желудочно-кишечные расстройства. В случае передозировки пациент должен обратиться к врачу.

Лечение: прием активированного угля внутрь, промывание желудка, проведение симптоматической терапии.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Нет данных.

Особые указания:

Не следует превышать рекомендуемую дозу.

Препарат содержит бета-каротин, поэтому его не следует принимать курильщикам и лицам употребляющим большое количество алкоголя.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами.

Препарат не оказывает влияния на способность к вождению автомобиля и управлению другими механизмами.

Форма выпуска:

10 капсул в блистере, по 3 блистера с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

36 месяцев. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.



Belinda

Произведено для:

BELINDA Laboratories

Лондон, Великобритания

Производитель:

FORTEX NUTRACEUTICALS Ltd.,

10, Prohladen kat str, Suhodol distr,

София 1362, Болгария